

تأثیر داروی لووستاتین بر استئوپروتگرین سرم در افراد مبتلا به نفروپاتی دیابت نوع ۲

نریمان نظامی (MD)^۱، مهرداد اصغری (BSc)^{۲*}، جاوید صفا (MD)^۳، محمد مهدی باقری اصل^۴،

بهزاد سالاری (MD)^۵، سونا قرشی (MD)^۱

- ۱- باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
- ۲- کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
- ۳- گروه نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
- ۴- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
- ۵- مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافت: ۹۰/۷/۹، اصلاح: ۹۰/۸/۱۸، پذیرش: ۹۰/۱۱/۱۹

خلاصه

سابقه و هدف: استئوپروتگرین (Osteo Protegrin, OPG)، گلیکوپروتئینی از خانواده بزرگ گیرنده فاکتور نکروز تومور آلفا می باشد. با در نظر گرفتن نقش محتمل OPG در بیماری های قلبی- عروقی و شیوع بالای این بیماری در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتیک نوع ۲ و نیز تأثیرات ضد آترواسکروتنیک استاتین ها، این مطالعه به منظور بررسی تأثیر لووستاتین بر میزان استئوپروتگرین سرم و لیگاند محلول فعال کننده گیرنده عامل هسته ای کاپا β (sRANKL) در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابت نوع ۲، انجام شده است.

مواد و روشها: این مطالعه شبه کارآزمایی بالینی (quasi clinical trial)، بر روی ۳۰ بیمار بالغ مذکر مبتلا به نفروپاتی دیابت نوع ۲ انجام شد. به هر بیمار روزانه ۲۰ میلی گرم لووستاتین به مدت ۹۰ روز تجویز گردید. مقدار OPG سرم و sRANKL با استفاده از کیت های تجارتي الایزا، در ابتدا، پس از ۹۰ روز تجویز و ۳۰ روز پس از قطع لووستاتین اندازه گیری و مقایسه شد.

یافته ها: مقدار OPG سرم بطور قابل توجهی پس از ۹۰ روز تجویز لووستاتین افزایش (۱۰/۷۶±۱۶/۴۴) و ۳۰ روز پس از قطع آن کاهش (۷/۳۸±۱۱/۹۸) یافت (p=۰/۰۰۲)، در حالی که در همین دوره، مقدار sRANKL به طور معنی داری به ترتیب کاهش (۱۱۹۲/۰۸±۵۷۸/۲۰) و افزایش (۴۴۱۸/۶۷±۲۱۲۴/۶۶) یافت (p<۰/۰۰۱).

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از کاهش احتمال خطر آترواسکلروز و کلسیفیکاسیون عروقی به دنبال تجویز استاتین ها در این بیماران می باشد.

واژه های کلیدی: استئوپروتگرین، لیگاند RANK، نفروپاتی دیابتیک، لووستاتین.

مقدمه

اخیرا نتایج آزمایشگاهی و تجربی نشان داده اند که OPG نه تنها در بازسازی استخوان نقش بسیار مهمی دارد بلکه به عنوان یک مولکول تنظیم کننده مهم، در آنژیوژنز نیز عمل می کند (۵-۲). چندین مطالعه بالینی همزمان نشان داده اند که میزان OPG سرم با بروز بیماری های قلبی- عروقی از جمله با بیماری عروق کرونر، مرگ و میر و پیش آگهی بد متعاقب انفارکتوس حاد میوکارد، کلسیفیکاسیون عروقی و سکتة مغزی ناشی از آنها مرتبط است (۱۲-۶). مطالعات متعدد اپیدمیولوژی نشان داده اند که افراد مبتلا به دیابت میزان OPG سرم

استئوپروتگرین (Osteo Protegrin, OPG)، گلیکوپروتئینی از خانواده بزرگ گیرنده فاکتور نکروز تومور آلفا است. این گلیکوپروتئین به همراه لیگاند فعال کننده گیرنده عامل هسته ای کاپا β (RANKL) و گیرنده آن RANK، تریاد مولکولی را تشکیل می دهند که از طریق کنترل استوکلاستها، متابولیسم استخوان را تنظیم می کند (۱). RANKL با اتصال به گیرنده RANK، استوکلاستونها را جذب استخوان ها را تقویت می کند. OPG با اتصال به RANKL، آن را خنثی کرده و از این طریق مانع جذب استخوان می گردد (۱).

* مسئول مقاله:

آدرس: تبریز، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، تلفن: ۴۴۱۹۷۵۷-۴۴۱۱

e-mail: asghari_ms@yahoo.com

تأثیر داروی لووستاتین بر استئوپروترگین سرم در افراد مبتلا به نفروپاتی دیابت نوع ۲؛ نرمیان نظامی و همکاران

تغییر عمده در فشار خون، مصرف پروتئین و فعالیت فیزیکی در طول دوره مطالعه به عنوان معیار حذف در نظر گرفته شد. همچنین افراد با مصرف آنتاگونیست های HMG-CoA، فیبرات ها، آسپرین، β -بلاکرها، آلوپورینول، ویتامین ها، پنتوکسیفیلین، روغن ماهی یا سایر داروهای های آنتی اکسیدانی، مصرف سیگار فعال، التهاب مزمن (مانند پای دیابتی، هپاتیت، عفونت و غیره)، وجود بیماریهای فعال مزمن عروق کرونری (تشخیص داده شده با علائم یا الکتروکاردیوگرام) و بیمارانی که در سه ماه اخیر میزان قند پلاسمای آنها به صورت نامناسب کنترل شده باشد (هموگلوبین $A1C < 7.5\%$)، نیز از مطالعه خارج شدند.

در نهایت اطلاعات ۳۰ بیمار مبتلا به نفروپاتی دیابت نوع ۲ در این مطالعه بررسی گردید (توان آزمون 0.80)، همچنین ۸ نفر از آنان به دلیل، عدم همکاری (دو بیمار)، مصرف ویتامین C در طول دوره مداخله (یک بیمار)، تغییر شرایط زندگی در طول دوره مداخله (یک بیمار)، استعمال دخانیات در طول دوره مداخله (یک بیمار)، سفر به یک منطقه دیگر (یک بیمار)، تغییر لووستاتین به آتورواستاتین توسط متخصص غدد درون ریز (یک بیمار) و سیر بیماری به مرحله نهایی بیماری کلیوی و نیاز به دیالیز (یک بیمار) از مطالعه خارج شدند.

پروتکل مطالعه: لووستاتین (شرکت غزل، تهران، ایران) به میزان 20mg/d به مدت ۹۰ روز تجویز گردید. در انتهای دوره مداخله (ماه سوم)، از شرکت کنندگان درخواست گردید که مصرف لووستاتین را از روز ۹۱ ام تا روز ۱۲۰ ام قطع نمایند. برای تعیین تغییرات پروفایل چربی و مقدار OPG، نمونه های خون سه بار از هر بیمار، یعنی قبل از درمان با لووستاتین (خط شروع)، بعد از ۹۰ روز درمان با آن و ۳۰ روز پس از قطع آن اخذ گردید.

نمونه گیری خون: نمونه های خون پس از ۱۲ ساعت ناشتایی در لوله های استریل جمع آوری شد و با 3000 دور بر دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه در 4°C درجه سانتیگراد سانتریفیوژ و تا زمان اندازه گیری در دمای منفی 79°C درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

آنالیز بیوشیمیایی: میزان گلوکز پلاسمای ناشتا، کلسترول کل، کلسترول با لیپوپروتئین چگالی بالا (HDL-C) و تری گلیسیرید با استفاده از معرف های تجاری با آنالیزور بیوشیمیایی اتوماتیک بررسی شدند. مقدار کلسترول با لیپوپروتئین چگالی کم (LDL-C) توسط معادله Friedewald محاسبه گردید (۲۶). مقدار کراتینین سرمی و نیتروژن اوره خون با استفاده از معرف های تجاری تهیه شده از شرکت آزمایشگاههای پارس آزمون (تهران، ایران) اندازه گیری شدند. میزان عملکرد کلیوی با استفاده از معادله Cockcroft-Gault تعیین گردید (۲۷). میزان OPG سرم، sRANKL و پروتئین واکنشگر-C با حساسیت بالا (hsCRP) با استفاده از کیت های الایزا تعیین گردید؛ OPG با استفاده از Bender Med Syste (درون و برون سنجش CV: 7% و 8% ؛ وین، اتریش)، sRANKL با کیت بیو وندور (درون و برون سنجش CV: $4/5\%$ و $5/5\%$ ؛ مدریس، جمهوری چک) و hsCRP با استفاده از کیت شرکت DRG (هامبورگ، آلمان) مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج به صورت میانگین $\pm$ انحراف استاندارد (SD) ارائه شدند. توزیع متغیرها با استفاده از تست های آزمون Z کولموگروف و اسمیرنوف، کشیدگی و چولگی مشخص گردید. آنالیز چند متغیره، آنالیز مدل عمومی خطی تکرار اندازه ها و آزمون t زوج برای ارزیابی اختلاف میان هر یک از دو مرحله، به طور مقتضی استفاده شدند. همبستگی توسط همبستگی پیرسون مطالعه گردید و $p < 0.05$ معنی دار تلقی گردید.

بالتری نسبت به افراد نرمال دارند. این بدین معنی است که میزان OPG سرم بالا از خصوصیات بیماران دیابتی بوده و با آترواسکلروز بدون علامت در هر دو نوع دیابت مرتبط است (۱۵-۱۳). همچنین در تازه ترین مطالعات صورت گرفته بر روی افراد دیابتی، ارتباط قوی بین OPG گردش خون و عوارض میکروواسکولر (۱۶)، دفع آلبومین ادراری (۱۷)، نوروپاتی (۱۸) و ضخامت انتیمامدیا کاروتیدی (۱۹) مشاهده گردید. میزان OPG سرم با ضخامت انتیمامدیا کاروتیدی در زنان با سابقه دیابت بارداری نیز مرتبط است (۲۰). عوامل مهارکننده ردونکاز (استاتین ها) ۳- هیدروکسی-۳-متیل گلوکاریل-کوآنزیم A (HMG-CoA) بطور محسوسی میزان کلسترول سرم، بروز بیماریهای قلبی-عروقی و مرگ و میر ناشی از آن را کاهش می دهند (۲۱). استاتین ها دارای تأثیرات مطلوب چندگانه شامل بهبود پروفایل چربی بیماران، کاهش التهاب، بهبود عملکرد اندوتلیال و ایجاد تأخیر در روند سیر بیماریهای قلبی-عروقی به سمت مرحله پایانی می باشند (۲۴-۲۲).

با در نظر گرفتن بروز دیس لیپیدمی و نیز شیوع بالای بیماریهای قلبی-عروقی و مرگ و میر ناشی از آن در افراد مبتلا به نفروپاتی دیابت نوع ۲، درمان تکمیلی با استاتین ها، اثرات ضد آترواسکلروتیک و چندگانه استاتین ها و همچنین ارتباط OPG با بیماریهای قلبی-عروقی، از آنجائیکه هیچ اطلاعاتی درباره تأثیر استاتین ها بر روی OPG سرم افراد مبتلا به نفروپاتی دیابت نوع ۲ وجود ندارد، این مطالعه به منظور بررسی تأثیرات تجویز ۹۰ روزه و قطع ۳۰ روزه داروی لووستاتین بر سطح OPG سرم و لیگاند محلول فعال کننده گیرنده عامل هسته ای کاپا β (sRANKL) در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتیک نوع ۲ انجام شده است.

مواد و روشها

جامعه مورد مطالعه: این مطالعه شبه کارآزمایی بالینی (quasi clinical trial) در کلینیک فوق تخصصی شیخ الرئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز (ایران) انجام شد. پس از ارزیابی های اولیه کلینیکی و آزمایشگاهی، ۳۸ بیمار مرد مبتلا به نفروپاتی دیابت نوع ۲ وارد مطالعه شدند. از آنجایی که هورمون های جنسی زنانه می توانند بر شاخص های بیوشیمیایی و فاز حاد التهاب تأثیر گذارند، زنان مبتلا به نفروپاتی دیابت نوع ۲، وارد مطالعه نگردیدند (۲۵). برای حذف فاکتورهای بالقوه مداخله گر، افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که دارای پروتئین ادراری کمتر از بازه نفروتیک (یعنی $> 3\text{ g/d}$) و عملکرد کلیوی بالای 30 ml/min (محاسبه شده با فرمول Cockcroft-Gault) بودند، در این مطالعه وارد شدند.

تمامی شرکت کنندگان رضایت نامه کتبی آگاهانه داده و پروتکل مطالعه توسط کمیته اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، که مطابق با بیانیه هلسینکی می باشد، تأیید گردید. گلوکز پلاسمای ناشتای شرکت کنندگان با تزریق انسولین و یا تجویز سولفونیل اوره خوراکی کنترل شد. فشار خون با استفاده از مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین و یا مسدود کننده گیرنده های آنژیوتانسین به همراه α -بلاکرها و مدرها، برحسب نیاز، زیر $129/79$ میلیمتر جیوه نگه داشته شد. تمام شرکت کنندگان تحت رژیم محدود پروتئینی منظم خود که توسط یک مشاور تغذیه تجویز شد، قرار گرفتند ($\leq 0.8\text{ g/kg/d}$). هرگونه

یافته ها

در نهایت اطلاعات ۳۰ بیمار که دوره مطالعه را با موفقیت به پایان رساندند آنالیز گردید. میانگین سن بیماران $54/54 \pm 6/12$ سال و میانگین پروتئین ادرار ۲۴ ساعته قبل از مطالعه نیز $1210/36 \pm 309/16$ میلی گرم در روز بود (جدول ۱). میزان گلوکز پلاسمای ناشتایی پس از دوره های مصرف و انقطاع، تغییر قابل توجهی نداشت. میزان کلسترول و LDL-C پس از سه ماه درمان با لووستاتین به طور قابل توجهی کاهش پیدا کردند. به علاوه، درمان با لووستاتین در پایان ماه سوم درمان، منجر به افزایش میزان HDL-C گردید. در مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده در روز ۹۰ ام درمان با لووستاتین، میزان کلسترول، تری گلیسیرید و LDL-C (به غیر از HDL-C) در ۳۰ روز پس از قطع لووستاتین بطور چشمگیری افزایش یافت ($p < 0.05$) (جدول ۲).

اختلافات قابل توجهی در طول دوره مطالعه در سطوح OPG سرم مشاهده شد (نمودار ۱). میانگین سطح OPG سرم پس از ۹۰ روز لووستاتین درمانی به طور معنی داری افزایش یافت ($p = 0.001$)، سپس مقدار آن در روز ۳۰ ام قطع لووستاتین درمانی نسبت به مقدار آن در روز ۹۰ ام درمان با لووستاتین به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد ($p = 0.002$). همچنین اختلاف معنی دار آماری در طول دوره مطالعه در سطوح sRANKL سرمی مشاهده شد (نمودار ۲). میانگین مقدار sRANKL سرم پس از ۹۰ روز درمان با لووستاتین به طور معنی داری کاهش یافت ($p = 0.001$). سپس مقدار آن در روز ۳۰ ام قطع درمان با لووستاتین به شدت (حتی بیشتر از میزان خط مبداء) افزایش پیدا کرد ($p < 0.001$).

علاوه بر یافته های فوق، اختلاف قابل توجهی نیز در طول دوره مطالعه در میزان hsCRP سرم مشاهده شد (نمودار ۳). میانگین مقدار hsCRP سرم پس از ۹۰ روز درمان با لووستاتین به طور قابل توجهی کاهش یافت ($p = 0.005$)، در حالی که قطع ۳۰ روزه لووستاتین منجر به افزایش میزان hsCRP سرم گردید.

($p = 0.007$). تغییرات OPG پس از سه ماه درمان با لووستاتین برخلاف رابطه معنی دار با تغییرات sRANK ($p = 0.01$ ، $r = -0.483$) و hsCRP ($p = 0.037$)، $r = -0.239$ ، با تغییرات ($p = 0.987$) کلسترول، ($p = 0.122$) تری گلیسیرید، HDL-C ($p = 0.712$) و LDL-C ($p = 0.788$) رابطه معنی داری نداشت.

جدول ۱. خصوصیات دموگرافیک بیماران و نتایج عملکرد کلیوی در افراد مورد مطالعه قبل از ورود به مطالعه


متغیرها	مقدار عددی Mean±SD
سن (سال)	۵۴/۵۴±۶/۱۲
نمایه توده بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)	۲۶/۸۳±۳/۱۱
فشار خون سیستولیک (میلی متر جیوه)	۱۲۴/۷۲±۱۱/۴۶
فشار خون دیاستولیک (میلی متر جیوه)	۷۲/۹۰±۵/۸۱
فشار خون بالا (%)	۴۳/۳۳%
طی دوران با فشار خون بالا (سال)	۳/۱۰±۳/۹۸
طی دوران با دیابت میلنوس (سال)	۹/۷۶±۳/۱۱
کراتینین سرم (میلی گرم بر دسی لیتر)	۱/۶۵±۰/۹۱
کلیرانس کراتینین (میلی لیتر بر دقیقه)	۶۸/۸۹±۳۰/۰۶
نیترژن اوره خون (میلی گرم بر دسی لیتر)	۵۴/۵۳±۳۲/۰۵
پروتئین ادرار ۲۴ ساعته (میلی گرم در روز)	۱۲۱۰/۳۶±۳۰۹/۱۶
کراتینین ادرار ۲۴ ساعته (میلی گرم در روز)	۹۷۴/۷۳±۷۰۶/۸۶
پروتئین/کراتینین ادرار ۲۴ ساعته	۰/۸۱±۰/۴۸
حجم ادرار ۲۴ ساعته	۲۱۱۶/۶۷±۹۳۹/۲۱

جدول ۲. تغییرات در گلوکز پلاسمای ناشتایی و پروفایل چربی افراد مبتلا به نفروپاتی دیابت نوع ۲ پس از سه ماه درمان با لووستاتین و یک ماه پس از انقطاع آن


P value		زمان ارزیابی Mean±SD		متغیرها	
P ^b	P ^a	۳۰ روز پس از قطع دارو	۹۰ روز پس از شروع دارو	شروع مطالعه	
۰/۴۴۸	۰/۴۹۱	۱۵۶/۶۰±۵۷/۲۷	۱۵۱/۵۸±۵۷/۶۵	۱۵۹/۱۷±۶۷/۵۳	گلوکز پلاسمای ناشتایی (میلی گرم بر دسی لیتر)
<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱	۱۹۸/۴۰±۴۸/۱۸	۱۶۵/۴۳±۴۰/۴۱	۱۹۹/۰۰±۴۳/۳۳	کلسترول کل (میلی گرم بر دسی لیتر)
۰/۱۰	۰/۲۰۵	۲۰۶/۵۰±۱۴۱/۰۲	۱۷۰/۹۰±۹۵/۲۴	۱۷۵/۳۷±۹۴/۹۷	تری گلیسیرید (میلی گرم بر دسی لیتر)
۰/۰۷۱	۰/۰۰۸	۴۰/۶۰±۴/۴۹	۴۲/۴۷±۴/۳۸	۴۰/۰۰±۵/۳۰	کلسترول HDL (میلی گرم بر دسی لیتر)
<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱	۱۰۶/۹۸±۳۸/۴۷	۸۲/۲۲±۳۶/۶۸	۱۱۵/۸۶±۴۷/۳۳	کلسترول LDL (میلی گرم بر دسی لیتر)
۰/۰۰۲	۰/۰۰۱	۱۶۹/۳۷±۴۲/۲۶	۱۷۶/۷۵±۴۳/۰۰	۱۶۵/۹۹±۴۴/۸۱	استوپروتئین (پیکوگرم بر دسی لیتر)
<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱	۱۴۳۵۲/۷۲±۶۹۰۱/۳۴	۹۹۳۴/۰۵±۴۷۷۶/۶۷	۱۱۱۲۶/۱۴±۵۳۴۹/۸۸	sRANKL* (پیکوگرم بر دسی لیتر)

* لیگاند فعال کننده گیرنده عامل هسته ای کاپا β^a مقایسه بین شروع مطالعه و ۹۰ روز پس از درمان با لووستاتین^b مقایسه بین ۹۰ روز پس از درمان با لووستاتین با ۳۰ روز پس از قطع آن


تأثیر داروی لووستاتین بر استئوپروترگین سرم در افراد مبتلا به نفروپاتی دیابت نوع ۲؛ نریمان نظامی و همکاران



نمودار ۱. مراحل پیاپی OPG سرم در افراد مبتلا به نفروپاتی دیابتیک نوع ۲؛ شروع مطالعه (خط آغاز)، ۹۰ روز پس از لووستاتین درمانی و ۳۰ روز پس از قطع لووستاتین. مقدار OPG سرم بطور قابل توجهی پس از تجویز و قطع لووستاتین، به ترتیب افزایش و کاهش یافت.



نمودار ۲. مراحل پیاپی مقدار لیگاند محلول فعال کننده گیرنده عامل هسته ای کاپا β (sRANKL) در افراد مبتلا به نفروپاتی دیابتیک نوع ۲؛ شروع مطالعه (خط آغاز)، ۹۰ روز پس از لووستاتین درمانی و ۳۰ روز پس از قطع لووستاتین. سطح sRANKL بطور قابل توجهی پس از تجویز و قطع لووستاتین، به ترتیب کاهش و افزایش یافت.



نمودار ۳. مراحل پیاپی میزان پروتئین واکنشگر-C با حساسیت بالا (hsCRP) در افراد مبتلا به نفروپاتی دیابتیک نوع ۲؛ شروع مطالعه (خط آغاز)، ۹۰ روز پس از لووستاتین درمانی و ۳۰ روز پس از قطع لووستاتین. میزان hsCRP سرم بطور قابل توجهی پس از تجویز و قطع لووستاتین، به ترتیب کاهش و افزایش یافت.

بحث و نتیجه گیری

داروهای مهارکننده ردوکتاز HMG-CoA به دلیل اثرات مفید چندگانه، ابزار قابل توجهی برای غلبه بر ناهنجاری های پروفایل چربی (به خصوص در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲) می باشند (۳۳). تجویز استاتین ها، بطور عمده ای، پیشرفت بیماری های قلبی- عروقی را در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ کاهش می دهد (۳۴). مطالعه حاضر نشان داد که درمان با لووستاتین و قطع آن به ترتیب میزان OPG را در افراد دیابتیک نوع ۲ افزایش و سپس کاهش می دهد. در یک مطالعه گزارش شد که سه ماه درمان با سیمواستاتین به مقدار ۴۰ mg/day، میزان OPG را در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر افزایش می دهد (۳۵). تأثیر سیمواستاتین بر میزان OPG سرم در آن مطالعه نزدیک به نتایج لووستاتین، اما در سطحی قوی تر از آن بود (۳۷٪ در مقابل ۶/۵٪). تفاوت بین اثرات سیمواستاتین و لووستاتین می تواند به دلیل تفاوت در نوع استاتین، دوز تجویز شده و جمعیت مورد مطالعه باشد. در واقع، افراد دیابتی در آن مطالعه کنار گذاشته شدند و فقط افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر در مطالعه گنجانده شدند، درحالی که در مطالعه حاضر فقط افراد دیابتی مورد ارزیابی قرار گرفتند و افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر کنار گذاشته شدند. آنچه که از مطالعات پیشین مشهود است این است که افراد دیابتی میزان OPG سرمی بالاتری دارند (۳۶).

در این مطالعه میانگین میزان OPG سرم پس از ۹۰ روز درمان با لووستاتین بطور معنی داری افزایش یافت و مقدار آن ۳۰ روز پس از قطع لووستاتین بطور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. میزان OPG سرم در افراد مبتلا به دیابت بالا می باشد (۲۹-۱۳). منشأ این میزان بالای OPG در افراد دیابتی فاقد بیماریهای عروقی، نامشخص است. به نظر می رسد که مقاومت به انسولین و سایتوکاین های التهابی ممکن است منشأ افزایش میزان OPG سرم در این بیماران بوده و نشانگر اختلال عملکرد اندوتلیال در افراد مبتلا به دیابت باشد. از جمله عملکردهایی که برای OPG و لیگاند آن مطرح شده است ایفای نقش در تعدیل سیستم ایمنی بدن و آترواسکلروز می باشد (۳۰). مطالعات مقطعی متعددی رابطه بین میزان OPG و آترواسکلروز عروق کرونری بدون علامت را نشان داده اند (۶ و ۹) و سطح OPG سرم را می توان به عنوان پیشگوی کننده بیماری عروق کرونر بدون علامت یا آترواسکلروز در نظر گرفت (۳۱ و ۳۲). بنابراین کنترل میزان OPG سرم می تواند یک شیوه درمانی مکمل بسیار مهم در طول درمان OPG برای جلوگیری از پیشرفت احتمالی بیماریهای قلبی- عروقی محسوب گردد.

Effect of Lovastatin on Serum Osteoprotegerin Level in Type 2 Diabetic Nephropathy

N. Nezami (MD)¹, M. Asghari (BSc)^{2*}, J. Safa (MD)³, M.M. Bagheri Asl⁴, B. Salari (MD)⁵,
S. Ghorashi (MD)¹

1. Young Researchers Club, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran
2. Students Research Committee, Faculty of Paramedical Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3. Department of Nephrology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
4. Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
5. Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

J Babol Univ Med Sci; 14(4); Jul 2012; pp: 61-70.

Received: Oct 1st 2011, Revised: Nov 9th 2012, Accepted: Feb 8th 2012.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Osteoprotegerin (OPG), a glycoprotein is a member of the tumor necrotizing factor alpha receptor super-family. By considering the possible role of OPG in cardiovascular disease (CVD), higher incidence of CVD in patients with type 2 diabetic nephropathy (T2DN), and anti-atherosclerotic effects of statins, the present study aimed to investigate the effects of lovastatin on serum levels of OPG, and soluble receptor activator of nuclear factor- κ B ligand (sRANKL) in people with T2DN.

METHODS: During the present quasi clinical trial, 30 male adult patients with type 2 diabetic nephropathy were studied. Lovastatin, 20 mg/d was administrated for 90 days. Serum levels of OPG and sRANKL were measured using commercial ELISA kits at baseline, after 90 days of intervention, and after 30 days of withdrawal of lovastatin.

FINDINGS: Serum level of OPG was significantly increased (10.76 ± 16.44) and decreased (7.38 ± 11.98) during 90 days of intervention and 30 days of withdrawal periods, respectively ($p < 0.002$), while sRANKL level was significantly decreased (1192.08 ± 578.20) and increased (4418.67 ± 2124.66) during the same periods, respectively ($p < 0.001$).

CONCLUSION: These results indicate decreased risk of atherosclerosis and vascular calcification following lovastatin administration.

KEY WORDS: *Osteoprotegerin, RANK ligand, Diabetic Nephropathy, Lovastatin.*

*Corresponding Author;

Address: Students Research Committee, Faculty of Paramedical Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

Tel: +98 411 4419757

E-mail: asghari_ms@yahoo.com

References

1. Simonet WS, Lacey DL, Dunstan CR, et al. Osteoprotegerin: a novel secreted protein involved in the regulation of bone density. *Cell* 1997;89(2):309-19.
2. Schoppet M, Preissner KT, Hofbauer LC. RANK ligand and osteoprotegerin paracrine regulator of bone metabolism and vascular function. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2002;22(4):549-53.
3. Bucay N, Sarosi I, Dunstan CR, et al. Osteoprotegerin-deficient mice develop early onset osteoporosis and arterial calcification. *Genes Dev* 1998;12(9):1260-8.
4. Price PA, June HH, Buckley JR, Williamson MK. Osteoprotegerin inhibits artery calcification induced by warfarin and by vitamin D. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2001;21(10):1610-6.
5. Bennett BJ, Scatena M, Kirk EA, et al. Osteoprotegerin inactivation accelerates advanced atherosclerotic lesion progression and calcification in older ApoE-/-mice. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2006;26(9):2117-24.
6. Jono S, Ikari Y, Shioi A, et al. Serum osteoprotegerin levels are associated with the presence and severity of coronary artery disease. *Circulation* 2002;106(10):1192-4.
7. Schoppet M, Sattler AM, Schaefer JR, Herzum M, Maisch B, Hofbauer LC. Increased osteoprotegerin serum levels in men with coronary artery disease. *J Clin Endocrinol Metab* 2003;88(3):1024-8.
8. Abedin M, Omland T, Ueland T, et al. Relation of osteoprotegerin to coronary calcium and aortic plaque (from the Dallas Heart Study). *Am J Cardiol* 2007;99(4):513-8.
9. Rhee EJ, Lee WY, Kim SY, et al. Relationship of serum osteoprotegerin levels with coronary artery disease severity, left ventricular hypertrophy and C-reactive protein. *Clin Sci (Lond)* 2005;108(3):237-43.
10. Kiechl S, Schett G, Wenning G, et al. Osteoprotegerin is a risk factor for progressive atherosclerosis and cardiovascular disease. *Circulation* 2004;109(18):2175-80.
11. Omland T, Ueland T, Jansson AM, et al. Circulating osteoprotegerin levels and long-term prognosis in patients with acute coronary syndromes. *J Am Coll Cardiol* 2008;51(8):627-33.
12. Van Campenhout A, Golledge J. Osteoprotegerin, vascular calcification and atherosclerosis. *Atherosclerosis* 2009;204(2):321-9.
13. Secchiero P, Corallini F, Pandolfi A, et al. An increased osteoprotegerin serum release characterizes the early onset of diabetes mellitus and may contribute to endothelial cell dysfunction. *Am J Pathol* 2006;169(6):2236-44.
14. Rasmussen LM, Tarnow L, Hansen TK, Parving HH, Flyvbjerg A. Plasma osteoprotegerin levels are associated with glycaemic status, systolic blood pressure, kidney function and cardiovascular morbidity in type 1 diabetic patients. *Eur J Endocrinol* 2006;154(1):75-81.
15. Anand DV, Lahiri A, Lim E, Hopkins D, Corder R. The relationship between plasma osteoprotegerin levels and coronary artery calcification in uncomplicated type 2 diabetic subjects. *J Am Coll Cardiol* 2006;47(9):1850-7.
16. Knudsen ST, Foss CH, Poulsen PL, Andersen NH, Mogensen CE, Rasmussen LM. Increased plasma concentrations of osteoprotegerin in type 2 diabetic patients with microvascular complications. *Eur J Endocrinol* 2003;149(1):39-42.
17. Xiang GD, Pu JH, Zhao LS, Sun HL, Hou J, Yue L. Association between plasma osteoprotegerin concentrations and urinary albumin excretion in type 2 diabetes. *Diabetes Med* 2009;26(4):397-403.

- 18.Terekeci HM, Senol MG, Top C, et al. Plasma osteoprotegerin concentrations in type 2 diabetic patients and its association with neuropathy. *Exp Clin Endocrinol Diabetes* 2009;117(3):119-23.
- 19.Ishiyama M, Suzuki E, Katsuda J, et al. Associations of coronary artery calcification and carotid intima-media thickness with plasma concentrations of vascular calcification inhibitors in type 2 diabetic patients. *Diabetes Res Clin Pract* 2009;85(2):189-96.
- 20.Akinci B, Demir T, Celtik A, et al. Serum osteoprotegerin is associated with carotid intima media thickness in women with previous gestational diabetes. *Diabetes Res Clin Pract* 2008;82(2):172-8.
- 21.Sadowitz B, Maier KG, Gahtan V. Basic Science Review: Statin therapy--part I: the pleiotropic effects of statins in cardiovascular disease. *Vasc Endovascular Surg* 2010;44(4):241-51.
- 22.Lipinski MJ, Abbate A, Fuster V, Vetrovec GW. Drug insight: statins for nonischemic heart failure: evidence and potential mechanisms. *Nat Clin Pract Cardiovasc Med* 2007;4(4):196-205.
- 23.van der Harst P, Voors AA, van Gilst WH, Böhm M, van Veldhuisen DJ. Statins in the treatment of chronic heart failure: biological and clinical considerations. *Cardiovasc Res* 2006;71(3):443-54.
- 24.Gadi R, Samaha FF. Dyslipidemia in type 2 diabetes mellitus. *Curr Diab Rep* 2007;7(3):228-34.
- 25.Jilma B, Dirnberger E, Löscher I, et al. Menstrual cycle-associated changes in blood levels of interleukin-6, alpha1 acid glycoprotein, and C-reactive protein. *J Lab Clin Med* 1997;130(1):69-75.
- 26.Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low- density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. *Clin Chem* 1972;18(6):499-502.
- 27.Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. *Nephron* 1976;16(1):31-41.
- 28.Knudsen ST, Jeppesen P, Poulsen PL, et al. Plasma concentrations of osteoprotegerin during normo- and hyperglycaemic clamping. *Scand J Clin Lab Invest* 2007;67(2):135-42.
- 29.Shin JY, Shin YG, Chung CH. Elevated serum osteoprotegerin levels are associated with vascular endothelial dysfunction in type 2 diabetes. *Diab Care* 2006;29(7):1664-6.
- 30.Vega D, Maalouf NM, Sakhaee K. Clinical Review: The role of receptor activator of nuclear factor-kappaB (RANK)/RANK ligand/osteoprotegerin: clinical implications. *J Clin Endocrinol Metab* 2007;92(12):4514-21.
- 31.Avignon A, Sultan A, Piot C, Elaerts S, Cristol JP, Dupuy AM. Osteoprotegerin is associated with silent coronary artery disease in high-risk but asymptomatic type 2 diabetic patients. *Diab Care* 2005;28(9):2176-80.
- 32.Crisafulli A, Micari A, Altavilla D, et al. Serum levels of osteoprotegerin and RANKL in patients with ST elevation acute myocardial infarction. *Clin Sci (Lond)* 2005;109(4):389-95.
- 33.Grundy SM. HMG-CoA reductase inhibitors for treatment of hypercholesterolemia. *N Engl J Med* 1988;319(1):24-32.
- 34.Kempler P. Learning from large cardiovascular clinical trials: classical cardiovascular risk factors. *Diab Res Clin Pract* 2005;68(Suppl 1):S43-7.
- 35.Celińska-Löwenhoff M, Löwenhoff T, Undas A, Gluszko P. Effects of hypolipemic drugs on the osteoprotegerin- sRANKL system in patients with coronary artery disease. *Thromb Haemost* 2007;97(5):868-70.
- 36.Collin-Osdoby P. Regulation of vascular calcification by osteoclast regulatory factors RANKL and osteoprotegerin. *Circ Res* 2004;95(11):1046-57.

37. Nellemann B, Gormsen LC, Dollerup J, et al. Simvastatin reduces plasma osteoprotegerin in type 2 diabetic patients with microalbuminuria. *Diab Care* 2007;30(12):3122–4.
38. Mori K, Jono S, Emoto M, et al. Effects of pravastatin on serum osteoprotegerin levels in patients with hypercholesterolemia and type 2 diabetes. *Angiology* 2010;61:86-91.
39. Yaturu S, Rains J, Jain SK. Relationship of elevated osteoprotegerin with insulin resistance, crp, and TNF-alpha levels in men with type 2 diabetes. *Cytokine* 2008;44(1):168-71.
40. Kazama JJ, Shigematsu T, Yano K, et al. Increased circulating levels of osteoclastogenesis inhibitory factor (osteoprotegerin) in patients with chronic renal failure. *Am J Kidney Dis* 2002;39(3):525-32.
41. Nitta K, Akiba T, Uchida K, et al. The progression of vascular calcification and serum osteoprotegerin levels in patients on long-term hemodialysis. *Am J Kidney Dis* 2003;42(2):303-9.
42. Morony S, Tintut Y, Zhang Z, et al. Osteoprotegerin inhibits vascular calcification without affecting atherosclerosis in ldlr (-/-) mice. *Circulation* 2008;117(3):411-20.
43. Ueland T, Jemtland R, Godang K, et al. Prognostic value of osteoprotegerin in heart failure after acute myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol* 2004;44(10):1970–6.
44. Thunyakitpisal PD, Chaisuparat R. Simvastatin, an HMG-CoA reductase inhibitor, reduced the expression of matrix metalloproteinase-9 (Gelatinase B) in osteoblastic cells and HT1080 fibrosarcoma cells. *J Pharmacol Sci* 2004;94(4):403-9.